

INSETTICIDA

1 - Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bendiocarb 80 g

coformulanti q. b. a 100.

2 – Sostanza attiva

Bendiocarb

3 – Caratteristiche del prodotto

Insetticida in polvere bagnabile. Per combattere insetti striscianti ed altri insetti infestanti all'interno e nelle adiacenze di aree civili e industriali. Uso professionale. Da usare solamente come insetticida, da squadre specializzate che dovranno evitare ogni pericolo di contaminazione diretto o indiretto dei generi alimentari e dell'uomo.

4 - Spettro d'azione

MULTAMAT è indicato per il controllo di insetti volanti, di insetti striscianti, di insetti dannosi ai materiali e di altri artropodi dannosi o molesti come scarafaggi, formiche, cimici, cimici dei letti, infestanti dei tappeti, pulci, pesciolini d'argento, tignole. MULTAMAT è indicato anche per il controllo delle vespe e dei loro nidi.

5 - Aree di impiego

MULTAMAT è un insetticida in polvere bagnabile indicato per la disinfestazione di fabbricati e strutture in genere quali negozi, edifici industriali, capannoni, abitazioni, scuole, alberghi, ostelli, ospedali, case di riposo. Può essere inoltre utilizzato nella disinfestazione di stive di navi, carrozze ferroviarie, aerei, autobus, containers e magazzini, esclusi quelli contenenti derrate alimentari.

6 - Istruzioni, Modalità e dosi d'impiego

ISTRUZIONI PER L'USO

DOVE SI USA

Applicarlo ovunque si riscontri la presenza degli infestanti compresi materassi e suppellettili (imbottiture, cuscini, ecc) e le loro strutture (bordi di letti, di poltrone, di sedute). Non applicarlo a persone, animali, abiti o biancheria da letto. Non applicarlo all'interno di recipienti, condutture o trasportatori che possono in qualsiasi modo venire a contatto con cibi o mangimi crudi o cotti. Non applicarlo sulle superfici dove vengono conservati, preparati o mangiati cibi crudi o cotti.

DOSE D'IMPIEGO

Preparare una soluzione allo 0,3% diluendo 15 g di MULTAMAT (1 bustina idrosolubile) in 5 litri di acqua per trattare 125 mq. Mettere direttamente nell'acqua del serbatoio il numero di sacchetti idrosolubili previsto. Ripetere il trattamento 6-8 settimane più tardi e quando riappaiono gli infestanti. Usare 30 g (2 bustine idrosolubili) in 5 litri di acqua quando:

- è richiesto un periodo più lungo di protezione,

- si è in presenza di una massiccia infestazione,
- si presentano persistenti condizioni antigieniche.

COME SI USA

Aggiungere il quantitativo richiesto di MULTAMAT, o il numero di sacchetti idrosolubili prescritti, all'acqua e mescolare bene. Se intercorre del tempo tra la miscelazione e l'uso agitare ancora prima di spruzzarlo.

Usare solo irroratore a bassa pressione. Applicare a tutte le superfici quanto basta per bagnarle, compresi: stretti passaggi, crepe e fessure, dietro e lungo gli zoccoli delle pareti, dietro e lungo le condutture dell'acqua e negli altri nascondigli. Controllo delle cimici dei letti: applicare la miscela sulle aree (muri, angoli) adiacenti a poltrone, letti infestati. Prima del trattamento rimuovere lenzuola, coperte e trattare direttamente i materassi, le altre suppellettili infestate e le strutture portanti di letti, poltrone, etc.. **NON** trattare materiali o tessuti che verranno in contatto diretto con le persone

Controllo delle Vespe: applicare la miscela direttamente sul nido e le vespe. Trattare anche le aree circostanti il nido.

7 - Registrazione

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione n° 7917 del Ministero della Salute

8 - Simboli di pericolo



Avvertenza: **PERICOLO**

9 - Indicazioni di pericolo e Consigli di prudenza

INDICAZIONI DI PERICOLO

H300 Letale se ingerito. H330 Letale se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

10 - Informazioni per il medico

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione. Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia. Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione,

tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. Consultare un Centro Antiveleni.

11 – Avvertenze

Durante le operazioni di preparazione e di irrorazione delle miscele gli operatori debbono indossare tute, maschere e guanti. Deve essere usato solo dal personale di ditte private o pubbliche specializzate nei trattamenti di disinfestazione.

PRECAUZIONI

Indossare guanti di gomma o di PVC e scudo facciale quando si manipola il concentrato;

- Lavare il concentrato dalla pelle o dagli occhi immediatamente in caso di contaminazione;
- Evitare ogni contatto con la bocca;
- Evitare di lavorare nella nebbia dello spray;
- Indossare scudo facciale quando si spruzza sopra l'altezza delle spalle;
- Lavare le mani e la pelle esposta prima di mangiare, bere o fumare, e dopo il lavoro;
- Togliere o coprire tutti i cibi prima del trattamento;
- Proteggere le superfici delle attrezzature per cucinare e gli utensili per mangiare dalla contaminazione durante l'applicazione;
- Allontanare tutti gli animali durante il trattamento;
- Il contenitore non può essere riutilizzato.

DA NON VENDERSI SFUSO

12 - Confezione

150 g (10 x 15 g)

13 – Compatibilità

Il prodotto nelle modalità d'uso consigliate risulta essere compatibile con la maggior parte delle superfici lavabili (linoleum, vetro, laminati, ceramiche, ecc..). Nonostante ciò, data la varietà delle superfici e materiali esistenti, consigliamo prima dell'impiego di accertarsi dell'assenza di effetti secondari – assenza di macchie, aloni, residui, scolorimenti, ecc..- provando il prodotto su una zona nascosta e ridotta.

14 - Informazioni

Tel. 02/3972.1 – Internet: es.bayer.it

Strettamente riservata alla forza vendita, rivenditori, tecnici autorizzati.

Bayer CropScience srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma.

Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso riportate in etichetta.

® Marchio registrato Gruppo Bayer